

Lieber Patient,

wir haben Ihnen heute auf Grund Ihrer Beschwerden Medikamente verordnet. Bitte halten Sie nachfolgende Hinweise ein.

□ Amoxicillin □ Augmentan 875mg

Amoxicillin und Augmentan sind Antibiotika aus der Gruppe der Penicilline. Antibiotika sind Medikamente, die gezielt gegen Infektionen mit Kleinstlebewesen, vorwiegend Bakterien, eingesetzt werden.

- Halten Sie unbedingt die von uns festgelegte Einnahmemenge und Dauer ein – auch wenn die Beschwerden bereits abklingen.
- **Ihre individuelle Einnahme:**
.....
- Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe Stunde vor dem Essen mit einem Glas Wasser, auf keinen Fall mit Milch oder Fruchtsaft, ein.
- Normale Nebenwirkungen sind Magen-Darm- Beschwerden.
- Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie das Medikament sofort ab und wenden sich bitte an Ihren Hausarzt.

□ Clindamycin

Clindamycin ist ein Antibiotikum, das bei bekannter Penicillinunverträglichkeit eingesetzt wird. Kreuzallergien sind nicht bekannt.

- Halten Sie unbedingt die von uns festgelegte Einnahmemenge und Dauer ein – auch wenn die Beschwerden bereits abklingen.
- **Ihre individuelle Einnahme:**
.....
- Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe Stunde vor dem Essen mit einem Glas Wasser, auf keinen Fall mit Milch oder Fruchtsaft, ein.
- Normale Nebenwirkungen sind Magen-Darm- Beschwerden.
- Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie das Medikament sofort ab und wenden sich bitte an Ihren Hausarzt.

□ Unacid PD

Unacid PD ist ein Antibiotikum, das bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen eingesetzt wird aber auch als Abschirmung in Zusammenhang mit Bisphosphonaten.

- Halten Sie unbedingt die von uns festgelegte Einnahmemenge von **2 Tabletten täglich** ein – auch wenn die Beschwerden bereits abklingen.
- **Ihre individuelle Einnahmedauer beträgt:**
.....
- Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe Stunde vor dem Essen mit einem Glas Wasser, auf keinen Fall mit Milch oder Fruchtsaft, ein.
- Normale Nebenwirkungen sind Magen-Darm- Beschwerden.
- Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie das Medikament sofort ab und wenden sich bitte an Ihren Hausarzt.

□ Paracetamol 500

Paracetamol ist ein Schmerzmittel, das auch bei gleichzeitiger Einnahme von Cortison und ASS 100 eingesetzt werden darf.

- Halten Sie unbedingt die **maximale Einnahmemenge von 8 Tabletten täglich** ein – auch wenn die Beschwerden bereits abklingen.

□ Ibuprofen 400 mg/ 600 mg

Ibuprofen ist ein Schmerzmittel, das als Alternative zu Paracetamol eingesetzt werden kann, wenn eine Lebererkrankung bestehen.

- Halten Sie unbedingt die **maximale Einnahmemenge von 4 Tabletten täglich** ein – auch wenn die Beschwerden bereits abklingen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung!